

## MEJORA DE LA BIOSEGURIDAD DEL PORCINO EXTENSIVO: MITIGACIÓN DEL CONTACTO

### Instrucciones de trabajo sobre el mapa

1. Hacer mapa con PAC u otra fuente. Imprimir a tamaño adecuado.
2. En la ganadería:
  - Comprobar perímetro.
  - Indicar nombre y usos de las fincas limitantes.
  - Delimitar vallados interiores, indicando qué es ganadería frente a otros usos. Tabla cerramientos
  - Tipo de vallado: cinegético (c) y ganadero (g).
  - Indicar edificios, naves, almacenes, construcciones, cebaderos (cochiqueras, encerraderos no contemplados en los cerramientos, etc.).
  - Puntos de alimentación (nombrarlos con un número que se corresponda con una tabla y tipo: suelo, elevado).
  - Indicar fuentes de agua (nombrar con números que se corresponden con la tabla):
    - Arroyos y cauces estacionales, indicando zonas de permanencia de agua. en época seca
    - Ríos de cauce continuo.
    - Charcas permanentes.
    - Pilonos. Describir tipo
    - Pantano.
    - Escorrentías desde fuera.
    - Otras (indicar).

### Instrucciones sobre el trabajo de campo:

- Revisar perímetros y cerramientos, especialmente en zonas a priori de riesgo. Ver el estado de la vallas. Responsable de la valla. Anotar sobre mapa.
- Puntos de agua
  - Tabla
  - Recorridos de indicios: todo tipo, no solo de más riesgo. Caminar alrededor de puntos de riesgo. (Describir si ha habido cerdos previamente para diferenciar de jabalí)
- Puntos alimentación
  - Tabla
  - Recorridos de indicios: todo tipo, no solo de más riesgo. Un recorrido en dirección hacia monte más próximo. 500m.

FAUNA SILVESTRE	CARACTERÍSTICAS DEL PUNTO	RIESGO
<b>Sin indicios</b>	Completamente impermeabilizado frente a fauna silvestre	<b>1</b>
	Barreras potencialmente permeables a fauna silvestre	<b>2</b>
<b>Indicios moderados</b> (1 indicio/10 m)	Barreras potencialmente permeables a fauna silvestre y/o presencia de un punto de agua >20 m de diámetro	<b>3</b>
	Sin barreras o barreras permeables a fauna silvestre y/o presencia de un punto de agua <20 m de diámetro	<b>4</b>
<b>Indicios abundantes</b> (>1 indicio/10 m)	Independientemente del resto de características	<b>5</b>

- Indicar observaciones, diagnóstico de uso y medidas a proponer en la tabla
- Almacenes, mangas de manejo, instalaciones
- Fototrampeo: decidir en cuales el día que se vuelva
- Toma de barro: decidir en cuales y se tomarán en la visita de vuelta (fototrampeo).
- Fotografiar todos los puntos de agua

## MEJORA DE LA BIOSEGURIDAD DEL PORCINO EXTENSIVO: MITIGACIÓN DEL CONTACTO

[Cómo reducir los riesgos de transmisión de enfermedades desde reservorios silvestres]

### 1. Datos personales

Nombre ganadería:

Código REGA:

Municipio:

OCA:

Nombre ganadero/contacto:

Cargo:

Teléfono:

E-mail:

Dirección:

Trabajador responsable de los animales en finca:

Teléf. trabajador:

Veterinario responsable de la explotación:

Teléf. veterinario:

ADSG a la que se pertenece:

Número y categoría de trabajadores:

## 2. Ganadería (Finca) y manejo

Superficie Total Finca (has):

Superficie Ganadería (has):

Superficie aprovechada por porcino (has):

%forestal:

%pasto:

%dehesa:

Número de cabezas en extensivo de

Bovino:

Caprino:

Ovino:

Porcino:

Tipo de ganado (razas):

Indicar otras especies domésticas presentes:

Sobre porcino, subrayar lo que esté presente: núcleo reproductor /aprimalamiento/ montanera

Por especies, indicar unidades (rebaños, nº cabezas) ganaderas y lotes:

Por especies, criterio por el que se dividen los grupos (edad, estado reproductivo...):

Indicar por especies y tipo de producción, por, ej. aprimalamiento. ¿Se usa heno, ensilado, unifeed, tacos?

¿Propio o comprado? ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se administra?

Lugar de almacenamiento (nave, cobertizo, en suelo, en palet...)

Alimentación del ganado (por especies):

- Uso de las distintas parcelas en distintas épocas del año. Uso que se hace de ellas y cuando. Tener en cuenta los lotes y tipos de producción (p. ej. aprimalamiento). Anotad las parcelas según mapa.

- ¿Las distintas especies ganaderas (en caso de existir) comparten los mismos cercados? Indicar qué cercados, cuando y por quién.

- Procedencia de los animales (por tipo y especie):

<b>Año</b>	<b>Nº de mov. De entrada/nº de animales/entre ganaderías propias/otros</b>
<b>2015</b>	
<b>2016</b>	
<b>2017</b>	
<b>2018</b>	
<b>2019</b>	
<b>2020</b>	
<b>2021</b>	
<b>2022</b>	

Si se tiene, hacerlo por unidades ganaderas.

Problemas sanitarios (¿Cuáles? Por especie)

Generación de carroñas ganaderas (nº de animales y especie)

Vacas: Retirada oficial (\_\_\_%), enterramiento (\_\_\_%), carroñeros (\_\_\_%), Muladar (\_\_\_%)

Ovejas: Retirada oficial (\_\_\_%), enterramiento (\_\_\_%), carroñeros (\_\_\_%), Muladar (\_\_\_%)

Cabras: Retirada oficial (\_\_\_%), enterramiento (\_\_\_%), carroñeros (\_\_\_%), Muladar (\_\_\_%)

Cerdos: Retirada oficial (\_\_\_%), enterramiento (\_\_\_%), carroñeros (\_\_\_%), Muladar (\_\_\_%)

Caza: Retirada oficial (\_\_\_%), enterramiento (\_\_\_%), carroñeros (\_\_\_%), Muladar (\_\_\_%)

Otros: Retirada oficial (\_\_\_%), enterramiento (\_\_\_%), carroñeros (\_\_\_%), Muladar (\_\_\_%)

¿cuándo y cuantas se producen las carroñas? (hacer croquis por meses)

Generación de carroñas ganaderas (nº de animales y especie)

Especie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

En caso de utilizar muladar indicar cual:

Indicar observaciones al respecto del tratamiento de los residuos y la carroña:

¿Hay depredación de ganado? por ejemplo, primales



### 3. Fauna silvestre

¿La ganadería es coto de caza mayor o menor? Matricula:

¿La ganadería limita con cotos de caza mayor? ¿Cuántos?

Perímetro (m) ganadería limitante con finca de caza (mapa):

Matriculas de cotos vecinos (Mapa)

Número ciervos cazados/temporada: Número jabalíes cazados/temporada:

Otras (como caza menor):

Especies de fauna habituales (indicar el avistamiento directo de animales, no indicios), indicar otras:

Especie	Presencia					Localización
	A diario	Semanal	Mensual	Muy esporádica	Nunca	
Ciervo						
Jabalí						
Corzo						
Tejón						
Gamo						

Indicar las zonas donde se suele observar mayor cantidad de fauna silvestre o zonas con especial intensidad de indicios de fauna silvestre:

Suplemento alimento (cebo) ungulados en la granja. A quién, cómo, dónde (mapa), cuándo y cuánto. Especialmente, indicar si se ceba para esperas de jabalí.

## Tuberculosis

Resultados primer saneamiento anual en:

<b>Año</b>	<b>Número positivos</b>	<b>Número de animales investigados</b>	<b>Uso de IFN</b>	<b>Nº de mov. De entrada/nº de animales/entre ganaderías propias/otros</b>
<b>2015</b>				
<b>2016</b>				
<b>2017</b>				
<b>2018</b>				
<b>2019</b>				
<b>2020</b>				
<b>2021</b>				
<b>2022</b>				

Si se tiene, hacerlo por unidades ganaderas.

Sugerencia de finca/s control/es próxima/s (nombre, REGA, contacto) de bovino y porcino:

¿Vacío sanitario? ¿Cuándo? Experiencia tras vacío (nº animales introducidos, procedencia, resultados TB después)

¿Otros problemas sanitarios en rumiantes o cerdos? ¿Cuáles? ¿Casos de Tuberculosis en cerdos? Se quedan flacos y mueren?